



Globale HIV-Statistik

UNAIDS Factsheet zum Welt AIDS Tag am 1. Dezember 2020

Im Jahr 2019 (die neuesten verfügbaren Daten)

- 38 Millionen mit HIV lebende Menschen (2019)
- 26 Millionen Menschen erhalten eine antiretrovirale Therapie (Zeitpunkt Ende Juni 2020)
- 1.7 Millionen Menschen wurden 2019 neu mit HIV infiziert.
- 690 000 Menschen starben 2019 an AIDS-bedingten Krankheiten.
- 75.7 Millionen Menschen haben sich bis Ende 2019 seit Beginn der Epidemie mit HIV infiziert.
- 32,7 Millionen Menschen sind bis Ende 201 seit Beginn der Epidemie an AIDS-Erkrankungen gestorben.

Menschen, die mit HIV leben

- Im Jahr 2019 lebten 38 Millionen Menschen mit HIV, darunter
 - 36.2 Millionen Erwachsene
 - 1.8 Millionen Kinder (<15 Jahre)
- 81% aller mit HIV lebenden Menschen kannten ihren HIV-Status
- Etwa 7.1 Millionen Menschen wussten nicht, dass sie mit HIV leben.

Menschen, die mit HIV leben und Zugang zur antiretroviralen Therapie haben

- Bis Ende Juni 2020 hatten 26.0 Millionen Menschen mit HIV, Zugang zu einer antiretroviralen Therapie
- Im Jahr 2019 hatten 25.4 Millionen der mit HIV lebenden Menschen Zugang zu einer HIV-Therapie. Zum Vergleich: in 2010 waren es 7.7 Millionen Menschen
- Im Jahr 2019 hatten 67% aller Menschen, die mit HIV leben, eine Behandlung erhalten
 - 68% der mit HIV lebenden Erwachsenen im Alter von 15 Jahren und älteren Menschen hatten Zugang zur Behandlung, ebenso wie 53% der Kinder im Alter von 0-14 Jahren.
 - 73% der weiblichen Erwachsenen ab 15 Jahren hatten Zugang zur Behandlung, jedoch nur 61% der männlichen Erwachsenen ab 15 Jahren.
- 85% der schwangeren Frauen, die mit HIV leben hatten in 2019 Zugang zu antiretroviralen Medikamenten, um eine Übertragung von HIV auf ihre Kinder zu verhindern.

Neue HIV-Infektionen

- Seit dem Höhepunkt der Epidemie im Jahr 1998 konnten die Neuinfektionen mit HIV um 40% reduziert werden.
 - Im Jahr 2019 gab es ca. 1.7 Millionen neue HIV-Infektionen, verglichen mit 2.8 Millionen im Jahr 1998.
- Seit 2010 sind die Neuinfektionen mit HIV bei Erwachsenen um schätzungsweise 23% zurückgegangen, von 2.1 Millionen auf 1.7 Millionen in 2019.

- Seit 2010 sind die Neuinfektionen mit HIV bei Kindern um 52% zurückgegangen, von 310 000 im Jahr 2010 auf 150 000 in 2019.

AIDS-bedingte Todesfälle

- Die Zahl der AIDS-bedingten Todesfälle konnte seit dem Höhepunkt im Jahr 2004 um mehr als 60% reduziert werden.
 - Im Jahr 2019 starben weltweit 690 000 Menschen an AIDS-bedingten Krankheiten, verglichen mit 1.7 Millionen im Jahr 2004 und 1.1 Millionen in 2010
- Die Mortalität aufgrund von AIDS konnte seit 2010 um 39% gesenkt werden.

90–90–90 Ziele

- Im Jahr 2019 kannten 81% der mit HIV lebenden Menschen ihren Status
- Von den Menschen, die ihren Status kannten, hatten 82% Zugang zu HIV-Behandlung.
- Bei 88% derjenigen, die sich in Behandlung begaben, ist die Virusvermehrung unterdrückt
- Unter allen Menschen die mit HIV leben kannten im Jahr 2019 81% ihren Status, 67% hatten Zugang zu HIV-Therapien und 59% haben eine unterdrückte Virusvermehrung.

Frauen

- Jede Woche infizieren sich rund 5500 junge Frauen im Alter von 15-24 Jahren mit HIV.
 - In Afrika südlich der Sahara treten vier von sechs Neuinfektionen bei Jugendlichen im Alter von 15-19 Jahren bei Mädchen auf. Junge Frauen im Alter von 15-24 Jahren leben im Vergleich zu Männern doppelt so häufig mit HIV.
- Mehr als ein Drittel (35%) der Frauen auf der ganzen Welt haben irgendwann in ihrem Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt.
 - In einigen Regionen sind Frauen, die sexuelle Gewalt erleben, anderthalb Mal häufiger mit HIV infiziert als Frauen, die keine entsprechende Gewalterfahrungen hatten
- 48% aller HIV-Neuinfektionen in 2019 fanden unter Frauen und Mädchen statt. Im südlichen Afrika liegt der Anteil der Frauen und Mädchen unter allen HIV-Neuinfektionen bei 95%

Schlüsselgruppen

- Die Verteilung von HIV unter den Schlüsselgruppen und deren Sexualpartner*innen gestaltet sich wie folgt:
 - 62% der neuen HIV-Infektionen weltweit, darunter
 - 99% der HIV-Neuinfektionen finden in Osteuropa und Zentralasien
 - 97% der Neuinfektionen im Mittleren Osten und in Nord Afrika
 - 96% der Neuinfektionen in West- und Zentraleuropa, sowie in Nordamerika
 - 98% der Neuinfektionen in Asien und Westpazifik
 - 77% der Neuinfektionen in Lateinamerika
 - 69% der Neuinfektionen in West und Zentralafrika
 - 60% der Neuinfektionen in der Karibik
 - 28 % der Neuinfektionen Ost und Südafrika
- Das Risiko, HIV zu bekommen, ist:
 - 26 x höher bei Männern, die Sex mit Männern haben.
 - 29 x höher bei Menschen, die Drogen spritzen
 - 30 x höher für Sexarbeiter
 - 13 x höher für Transgender

HIV/Tuberkulose (TB)

TB ist nach wie vor die häufigste Todesursache bei Menschen, die mit HIV leben, und macht etwa einen von drei mit AIDS in Verbindung stehenden Todesfällen aus.

- Im Jahr 2018 erkrankten etwa 10,0 Millionen Menschen an TB, darunter 9% unter Menschen mit einer HIV-Infektion
 - Menschen, die mit HIV ohne TB-Symptome leben, benötigen eine TB-Präventionstherapie, die das Risiko einer TB-Erkrankung verringert und die TB/HIV-Todesraten um rund 40% reduziert.
 - 1,8 Millionen Menschen mit HIV in 65 Ländern begannen 2018 eine TB-Behandlung
- Schätzungsweise 44% der Menschen, die mit HIV und Tuberkulose leben, wissen nichts von ihrer ihrer Ko-Infektion und erhalten deshalb keine medizinische Hilfe.

Investitionen

- Ende 2019 standen 18.6 Milliarden US-Dollar für die AIDS-Bekämpfung in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zur Verfügung, das ist beinahe eine 1.3 Milliarden US Dollar weniger als in 2017
 - Rund 57% aller Gesamtressourcen für HIV in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen kamen in 2019 aus inländischen Quellen
- UNAIDS schätzt, dass in 2020 26.2 Milliarden US-Dollar für die Umsetzung von HIV-Programme benötigt werden.

Quelle: Fact Sheet zu Welt AIDS Tag 2020

<http://www.unaids.org>

Ergänzung Aktionsbündnis gegen AIDS

Update zu Aspekten globaler Diskriminierung (Quelle UNAIDS Bericht)

- 82 Länder kriminalisieren Formen der Nicht-Offenlegung des HIV Status, Übertragung und Aussetzung von HIV
- 103 Länder kriminalisieren Sexarbeit
- 108 Länder kriminalisieren Drogenkonsum oder –Besitz
- ca. 30 Länder deportieren Menschen aufgrund von HIV (Quelle: <https://hivtravel.org>)
- ca. 50 Länder haben diskriminierende Bestimmungen zu Einreise und Aufenthalt für Menschen mit HIV (Quelle: <https://hivtravel.org>)
- 76 Länder kriminalisieren und diskriminieren Schwule und andere LGBTI-Communities (<https://ilga.org>) Quelle: Fact Sheet zu Welt AIDS Konferenz 2020 <http://www.unaids.org>
- UNAIDS Bericht zur globalen AIDS Epidemie: <https://aids2020.unaids.org/report/> Quelle: Fact Sheet zur Welt AIDS Konferenz 2020 <http://www.unaids.org>

Übersetzung aus dem Englischen und Ergänzung

Aktionsbündnis gegen AIDS
 Rungestr 19
 19179 Berlin
 Mail: Info@aids-kampagne.de